

Classification tumorale T

- ▶ **T1 ≤ 1 mm**
 - **a** : sans ulcération et index mitotique $< 1/\text{mm}^2$
 - **b** : avec ulcération ou index mitotique $\geq 1/\text{mm}^2$
- ▶ **T2 >1 mm et ≤ 2 mm**
 - **a** : sans ulcération
 - **b** : avec ulcération
- ▶ **T3 >2 mm et ≤ 4 mm**
 - **a** : sans ulcération
 - **b** : avec ulcération
- ▶ **T4 >4 mm**
 - **a** : sans ulcération
 - **b** : avec ulcération.

Classification ganglions : N

- ▶ **N1** : 1 ganglion envahi
 - **a** : micrométastase
 - **b** : macrométastase
- ▶ **N2** : 2-3 ganglions envahis
 - **a** : micrométastase
 - **b** : macrométastase
 - **c** : métastases cutanées en transit/satellite sans ganglions atteints
- ▶ **N3** : 4 ganglions envahis ou plus, métastases cutanées "en transit" avec ganglions atteints.

Classification métastases : M

- ▶ **M1a** : métastases cutanées / sous cutanées à distance/ ganglions à distance ; LDH normales
- ▶ **M1b** : pulmonaire LDH normales
- ▶ **M1c** : autres localisations ; toutes localisations.

Classification en stades pronostiques

▶ Mélanome localisé **N0 M0**

- **Stade 0** : Tis
- **Stade IA** : T1a
- **Stade IB** : T1b et T2a
- **Stade IIA** : T2b et T3a
- **Stade IIB** : T3b et T4a
- **Stade IIC** : T4b.

▶ Métastases régionales **stade III, M0**

- **Stade IIIA** : tout T1-4a, N1a, N2a
- **Stade IIIB** : tout T1-4a : N1b, N2b, N2c ou T1-4b : N1a, N2a
- **Stade IIIC** : tout T1-4b : N1b, N2b, N2c ; tout T, N3.

▶ Métastases à distance = **Stade IV** : tout T, tout N, M1.

Classification histopathologique pTNM

▶ **pT- Tumeur primitive**

- **pTX** : Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive (comprend les shaving-biopsies et les mélanomes qui ont régressé)
- **pT0** : Pas de tumeur à l'examen histologique de la pièce
- **pTis** : Mélanome in situ (niveau I de Clark) (l'hyperplasie mélanocytaire atypique et la dysplasie mélanocytaire sévère ne sont pas considérées comme de nature maligne invasive)
- **pT1** : Tumeur ≤ 1 mm d'épaisseur
 - **pT1a** : niveau II ou III de Clark, sans ulcération
 - **pT1b** : niveau IV ou V de Clark, ou avec ulcération
- **pT2** : Tumeur >1 mm et ≤ 2 mm d'épaisseur
 - **pT2a** : sans ulcération
 - **pT2b** : avec ulcération
- **pT3** : Tumeur >2 mm et ≤ 4 mm d'épaisseur
 - **pT3a** : sans ulcération
 - **pT3b** : avec ulcération
- **pT4** : Tumeur >4 mm d'épaisseur
 - **pT4a** : sans ulcération

Classification AJCC 7ème édition (2009) des mélanomes cutanés

- **pT4b** : avec ulcération.

▶ **pN – Adénopathies régionales**

- Les catégories pN correspondent aux catégories N.
- L'examen histologique d'une lymphadénectomie régionale doit inclure habituellement 6 ganglions lymphatiques ou plus.
- Si les ganglions régionaux sont négatifs mais que le nombre habituellement examiné n'est pas atteint, la tumeur est classée comme pN0.
- La classification fondée uniquement sur l'exérèse du ganglion sentinelle sans lymphadénectomie ultérieure est désignée (sn) pour ganglion sentinelle par exemple pN1(sn) ;

▶ **pM – Métastases à distance**

- Les catégories pM correspondent aux catégories M.