

Champix[®] (Varénicline)

Prescription :

(1) Début 1 à 2 semaines avant date d'arrêt prévue

(2) J 1-3 : 1 cp à 0,5 mg/jour, comprimés avalés entiers avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas

J 4-7 : 1cp à 0,5 mg matin et soir

J 8- fin du traitement : 1 cp à 1 mg matin et soir

(3) Durée du traitement : 12 semaines (+ 12 semaines complémentaires possibles chez des sujets ayant arrêté de fumer)

(4) Conditionnement :

- deux premières semaines de traitement : 1 boîte avec 11 cp à 0,5 mg et 14 à 1 mg

- semaines suivantes : boîtes à 28 cp et 56 cp à 1 mg

- si posologie d'entretien réduite : boîte à 56 cp à 0,5 mg

(5) Prescription et délivrance :

- sur ordonnance

- non agréée à l'usage des collectivités

Contre-Indications :

- Hypersensibilité à la Varénicline ou à un des excipients
- < 18 ans
- Grossesse (contraception)
- Allaitement

Prévention et surveillance étroite :

Insuffisance rénale :

- légère : $50 \text{ ml/min} \leq \text{CC} \leq 80 \text{ ml/min}$: posologie habituelle

- modérée : $30 \text{ ml/min} \leq \text{CC} \leq 50 \text{ ml/min}$: posologie habituelle ; si événement

indésirable : posologie réduite à 1 mg/jour

- sévère : $\text{CC} < 30 \text{ ml/min}$: posologie à 1 mg/jour

Conduite et utilisation des machines :

- Demander au patient de s'assurer que la Varénicline ne modifie pas leur aptitude à pratiquer ces activités avant de les repratiquer

Mises en garde :

- L'arrêt du tabac, quel que soit le traitement (ou non), peut nécessiter un ajustement posologique de : théophylline, warfarine, insuline ; effet inducteur sur le CYP1A2
- A l'arrêt du traitement, augmentation de l'irritabilité, de l'envie de fumer, de la dépression, et/ou de l'insomnie pour 3% des patients ; les en avertir
- Pas d'interaction médicamenteuse cliniquement significative
- Ne pas associer de substituts nicotiques : augmentation des effets indésirables

Effets indésirables :

- Surviennent le plus souvent dans la première semaine de traitement
- Digestif : nausées (le plus fréquent), constipation, douleurs abdominales, flatulences, ...
- Neuropsychiatrique : insomnies, céphalées, perturbation des rêves
- Augmentation de l'appétit : liée au sevrage ?
- Diminution de posologie à 2 cp à 0,5 mg chez les patients qui ne tolèrent pas les effets indésirables

Afssaps :

- L'Afssaps a demandé à Pfizer la mise en place d'un plan de gestion des risques