

Zyban® L.P.

Prescription

- (1) 1 cp à 150 mg/j pendant 6 jours puis
- (2) 2 cp à 150 mg/j ; prises espacées de ≥ 8 hr
- (3) Décider d'une date d'arrêt de préférence entre J7 et J15
- (4) Durée du traitement : 7-9 semaines
- (5) Signaler à l'AFSSAPS les utilisations trop longues ou à posologies anormales (> 300 mg)

Contre-indications

- < 18 ans
- Hypersensibilité au Zyban ou à ses excipients
- Troubles convulsifs évolutifs
- Antécédents convulsifs
- Tumeur du SNC
- Sevrage alcoolique en cours
- Sevrage aux benzodiazépines en cours
- Boulimie actuelle ou antécédent de
- Anorexie mentale actuelle ou antécédent de
- Insuffisance hépatique sévère
- Prise d'IMAO (précaution spécifique si arrêt récent d'IMAO)
- Trouble bipolaire
- Grossesse
- Allaitement

Précautions et surveillance étroite

- Sujet âgé : 150 mg/j
- Insuffisance hépatique légère à modérée : 150 mg/j
- Insuffisance rénale : 150 mg/j
- Dépression : possibilité d'épisode psychotique

Indication à discuter et à retenir en

«cas de nécessité absolue» :

- ☞ Substances abaissant le seuil épileptique
 - antipsychotiques
 - antidépresseurs
 - antipaludéens
 - tranadol
 - théophylline
 - stéroïdes par voies systémiques
 - quinolones
 - antihistaminiques sédatifs
- ☞ Abus d'alcool
- ☞ Antécédents de traumatisme crânien
- ☞ Diabète traité par hypoglycémifiants ou insuline
- ☞ Usage de produits psychostimulants ou anorexigènes
- ☞ Conduite automobile et utilisation de machine avec prudence pour les patients *traités «après s'être assurés que la prise de Zyban® L.P. n'affectait pas leur performance »*

Interactions médicamenteuses

- Prudence avec médicaments induisant ou inhibant l'isoenzyme 2D6 du cytochrome P450
- Association avec dispositif transdermique à la nicotine :
 - rechercher 1 fois par semaine une augmentation de la TA
 - respecter la prescription de ces dispositifs
- Augmentation du taux sanguin de médicaments métabolisés par CYP1A2 :
 - théophylline
 - tacrine (cognex)
 - clozapine
 - éventuellement de : imipramine, olanzapine, clomipramine, fluvoxamine

- rôle possible sur :
 - flécaïnide
 - pentazocine
- Prudence avec produits à faible index thérapeutique métabolisés par CYP2D6 : risque d'augmentation des taux sanguins
 - antidépresseurs :
 - désipramine
 - imipramine
 - paroxétine
 - antipsychotiques :
 - rispéridone
 - thioridazine
 - bêtabloquants : metoprolol
 - anti-arythmiques de type IC :
 - propafénone
 - flécaïnide
- Prudence avec produits interférant avec l'isoenzyme CYP2B6 :
 - orphénadrine
 - cyclophosphamide
 - ifosfamide
- Prudence avec médicaments
 - inducteurs enzymatiques :
 - carbamazépine
 - phénobarbitol
 - phénytoïne
 - inhibiteurs enzymatiques :
 - valproate
- Prudence avec lévodopa

Interruptions du traitement en cas

- De convulsions
- Réactions d'hypersensibilité ou anaphylactique : éruption cutanée, prurit, urticaire, douleur thoracique, oedème, dyspnée
- Symptômes de maladie sérique : arthralgie, myalgie, fièvre

Zyban[®] L.P.

Effets Indésirables

Fréquence	Système-organe	Effets indésirables
Fréquents (>1/100)	Signes généraux Système gastro-intestinal Système nerveux central Peau/Hypersensibilité Organes des sens	Fièvre Sécheresse de la bouche, troubles digestifs incluant nausées et vomissements, douleur abdominale, constipation Insomnie, tremblements, trouble de la concentration, céphalées, sensations vertigineuses, dépressions, agitation, anxiété Eruption cutanée, prurits, sueurs. Réactions d'hypersensibilité telle que urticaire Troubles du goût
Occasionnels (>1/1 000 < 1/100)	Signes généraux Appareil cardiovasculaire Système nerveux central Système endocrinien et métabolisme Organe des sens	Douleur thoracique, asthénie Tachycardie, élévation de la pression artérielle (parfois sévère), bouffées vasomotrices Confusion Anorexie Acouphènes, troubles visuels
Rares (>1/10 000 < 1/1 000)	Appareil cardiovasculaire Système nerveux central Peau/Hypersensibilité	Vasodilatation, hypotension orthostatique, syncope Crise convulsive (1/1000), irritabilité, agressivité Réaction d'hypersensibilité plus sévère incluant œdème de Quincke, dyspnée/bronchospasme et choc anaphylactique. Arthralgie, myalgies et fièvre ont également été rapportées en association avec des éruptions cutanées et d'autres symptômes évocateurs d'une hypersensibilité retardée. Ces symptômes peuvent ressembler à ceux d'une maladie sérique. Des cas d'érythème polymorphe et de syndrome de Stevens-Johnson ont également été rapportés

[Référence : Vidal 2015 RCP bupropion révisé le 05.01.15]